

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

الملف الثالث {غير محلول}

إذا كان أ - ب = ٥ ، ب - ج = ٣ ، ج + د = ١ أو جد قيمة أ + د

أ ١

ب ٨

ج ٩

د ٤

أعطي طبيب لمريض يوم الخميس علبة دواء بها ٣٦ حبة ،
بحيث يأخذ كل يوم ٣ حبات , فأي يوم تنتهي علبة الدواء ؟


أ السبت

ب الأحد

ج الإثنين

د الثلاثاء

اوجد متوسط الأربعة أعوام



ب ٤٦

أ ٤٠

د ١١,٥

ج ١٢,٥

$(1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5) \times (5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1)$ ما الرقم في خانة العشرات ؟

أ ٠

ب ١


ج ٢

د ٤

سؤال 5 قارن بين

-القيمة الأولى : ٦

-القيمة الثانية : عدد القطع المستقيم في الشكل



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

$$\dots\dots\dots = 3 \dots 3 \times 1 \dots 1$$

$$3 \dots 6 \dots 3$$



$$3 \dots 6 \dots 3$$



$$3 \dots 6 \dots 3 \dots 3$$



$$3 \dots 6 \dots 3 \dots 3$$



إذا كان س-٢٠ = ص - ٢٠ ، اوجد النسبة بين س إلى ص

أ ١ : ١

ب ١ : ٢

ج ٣ : ٤

د ٢ : ٣

إذا كان v تتناسب عكسيا مع s ، $v = 4$ عندما $s = 6$ أوجد قيمة v عندما $s = 12$

د ٨

ج ٦

ب ٤

أ ٢

سؤال 9


اوجد قيمة س

أ ١١٠

ج ١٢٠

ب ١٠٠

د ١٣٠



سؤال 10

إذا كان $0.047 = \frac{\text{ص}}{1000} + \frac{\text{س}}{100}$ اوجد قيمة $\frac{\text{س}}{10} + \frac{\text{ص}}{100} + \frac{6}{1000}$

أ 0.647

ب 0.674

ج 0.476

د 0.746

سؤال 11 **قارن بين**

-القيمة الأولى : $\frac{11}{111}$

-القيمة الثانية : ٠,١

أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 12

في الشكل المجاور أوجد قيمه: ١٨٠ - س - ص



أ $\frac{٤}{٢}$

ب ٤

ج ٤٢

د ٤٤

طريق طوله ٨ كم , كم طوله بالأمطار تقريبا ؟

٧٥٠ د

٨٠٠ ج

٧٨٥٠ ب

٨٠٠٠ أ

إذا كان $n = 2$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $1 + \frac{1}{n^2} - \frac{2}{n}$

- القيمة الثانية : $\frac{1}{n}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

أى الأعداد الآتية يمكن كتابته علي صورة ٦ ن حيث ن عدد صحيح

أ ٣٢٥

ب ٤٣٤

ج ٢٢٢

د ٤٢٧

المنوال للقيم : ١، ١، ١، ٤، ٥، ٥، ٥، ٥، ٣، ٣، ٥

أ ١

ب ٣

ج ٤

د ٥

سلك قسم إلى قسمين متساويين الأول صنع منه
مستطيل والثاني دائره قارن بين

-القيمة الأولى : محيط المستطيل

-القيمة الثانية : محيط الدائره

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سلك طوله ١٥٠ سم و فيه كل ٢ سم ثقلهم ٣ جرام , فإذا
أضيف ثقل فأصبح طول السلك ١٦٠ سم , ما كتله الثقل ؟

د ١٨

ج ١٥

ب ١٢

أ ١٠

عند كتابه الأعداد من ١ إلى ١٠٠ كم مره يتم كتابه العدد ٩ ؟

أ ٩

ب ١٠

ج ٢٠

د ١١

ربع هللة كم تساوي بالريال ؟

أ ٠,٢٥

ب ٠,٠٢٥

ج ٠,٠٠٢٥

د ٠,٠٠٠٢٥

إذا وزعت ١٢٠ بيضة علي ٩ أطباق بالتساوي , كم بيضه بقيت ؟

أ ٠

ب ١

ج ٢

د ٣

إذا كان $\frac{5}{12} = \frac{3}{L} + \frac{2}{A}$

حيث أن $A \times L = 24$ ، أوجد قيمة $A + L$

أ ٥

ب ١٢

ج ١٠

د ٢٠

إذا كان $s = \frac{1}{2}$ ، أوجد قيمة $\frac{s^2 - 1}{s^2}$

أ $\frac{3}{4}$

ب $-\frac{3}{4}$

ج $\frac{1}{3}$

$\frac{1}{3}$

د $\frac{1}{3}$

$\frac{1}{3}$

يتسابق سعد واحمد في مضمار دائري طوله ٤٢٠ م , سعد بسرعة ٧ م / ث
وأحمد بسرعة ٥ م / ث , فإذا دار سعد دورتين , ما فرق المسافه بينه
وبين أحمد ؟

٤٠٠ د

٣٦٠ ج

٣٣٠ ب

٢٤٠ أ

إذا كان متسابقين يتسابقوا في مضمار دائري سرعه الأول ضعف سرعه الثاني , كم مره يلتقوا في ١٠ دورات ؟

د ١٠

ج ٥

ب ٢

أ ٠